

1	2	3	4	5

APELLIDO Y NOMBRE:

LIBRETA:

TURNO:

10 a 12:45

16:15 a 19

Algebra Lineal - 2do Cuatrimestre 2012
Recuperatorio 2 - 2do Parcial (18/12/2012)

1. (a) Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ tal que $A^t = -A$, con n impar. Calcular $\det(A)$.
 (b) Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tal que $A^2 + \text{Id}_n = 0$. Probar que entonces n es par. Dar un ejemplo de una tal A para $n = 2$, y luego para n par cualquiera.
 ¿Vale lo mismo si $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$?

2. Encontrar la solución $(x(t), y(t), z(t))$ del sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{cases} x'(t) = 3x(t) + y(t) - 2z(t) \\ y'(t) = 4y(t) - 2z(t) \\ z'(t) = y(t) + z(t) \end{cases}$$

con condiciones iniciales $x(0) = 1$, $y(0) = 3$, $z(0) = 2$.

3. Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz simétrica. Probar que A es definida positiva (i.e. $x^t A x > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $x \neq 0$) si y solo si todos los autovalores de A son positivos.

4. Se considera $\mathbb{C}^{m \times n}$ con el producto interno $\langle A, B \rangle = \text{tr}(AB^*)$.

(a) Sea $A = U\Sigma V^* \in \mathbb{C}^{m \times n}$ la descomposición en valores singulares de A , con valores singulares no nulos $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$. Probar que $\|A\|^2 = \sum_{i=1}^r \sigma_i^2$.

(b) Para $1 \leq k \leq r$, sea Σ_k la matriz diagonal igual a Σ pero donde se reemplazaron $\sigma_{k+1}, \dots, \sigma_r$ por 0, y sea $A_k = U\Sigma_k V^*$. Probar que $\text{rg}(A_k) = k$ y que $\text{dist}(A, A_k) = \sqrt{\sigma_{k+1}^2 + \dots + \sigma_r^2}$.
 (Comentario: A_k es la matriz de rango menor o igual a k que está a distancia mínima de A .)

5. Sea la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 & 0 \\ -1 & -2 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 2 & 4 & 12 & 0 \end{pmatrix}$$

Probar que existe una matriz $B \in \mathbb{C}^{4 \times 4}$ no diagonalizable tal que $B^2 = A$ (no hace falta encontrar B explícitamente).

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS