

1	2	3	4	5

APELLIDO Y NOMBRE:

LIBRETA:

TURNO:

10 a 12:45

16:15 a 19

TEMA 2

Algebra Lineal - 2do Cuatrimestre 2012

1er Parcial (13/10/2012)

1. Sean $S = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 3} : \text{cada una de las filas de } A \text{ suma } 0\}$ y $T = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 3} : \text{cada una de las columnas de } A \text{ suma } 0\}$.

- (a) Calcular $\dim(S \cap T)$ y $\dim(S + T)$.
 (b) Determinar un subespacio $U \subset \mathbb{R}^{2 \times 3}$ tal que $\mathbb{R}^{2 \times 3} = (S + T) \oplus U$.

2. Sean \mathbb{C}^2 y \mathbb{R}^3 los \mathbb{R} -espacios vectoriales con bases $\mathcal{B} = ((1, 1); (1 - 2i, 0); (i, 1); (0, i))$ de \mathbb{C}^2 y \mathcal{E}_3 la base canónica de \mathbb{R}^3 . Para cada $a \in \mathbb{R}$, sea $g_a : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal definida por

$$[g_a]_{\mathcal{B}\mathcal{E}_3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & a \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Determinar los valores de a para los cuales existe una t.l. $f_a : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{C}^2$ tal que $g_a \circ f_a = \text{Id}_{\mathbb{R}^3}$.
 (b) Para cada a hallado, determinar una tal f_a dando su expresión $f_a(x_1, x_2, x_3) = (z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$.

3. Sea V un K -espacio vectorial, y sea $f \in \text{End}_K(V)$. Probar que si $\text{Nu}(f) \cap \text{Im}(f) = \{0\}$, entonces $\text{Nu}(f) = \text{Nu}(f^2)$, y que si $V = \text{Nu}(f) + \text{Im}(f)$, entonces $\text{Im}(f) = \text{Im}(f^2)$.

4. Un caso particular de la interpolación de Hermite.

Sean $\varphi_{00}, \varphi_{01}, \varphi_{10}, \varphi_{11}$ los funcionales lineales en $\mathbb{R}_3[X]^*$ definidos por

$$\varphi_{00}(P) = P(0), \varphi_{01}(P) = P'(0), \varphi_{10}(P) = P(1), \varphi_{11}(P) = P'(1), \forall P \in \mathbb{R}_3[X].$$

- (a) Hallar una base \mathcal{B} de $\mathbb{R}_3[x]$ tal que $\mathcal{B}^* = (\varphi_{00}, \varphi_{01}, \varphi_{10}, \varphi_{11})$.
 (b) Probar que dados $a_{00}, a_{01}, a_{10}, a_{11} \in \mathbb{R}$, existe un único polinomio $P \in \mathbb{R}_3[X]$ que satisface las condiciones

$$P(0) = a_{00}, P'(0) = a_{01}, P(1) = a_{10}, P'(1) = a_{11}.$$

5. Sean $y = (1, 1, 1, 1, \dots, 1, 1)$, $z = (-1, 1, -1, 1, \dots, -1, 1) \in \mathbb{R}^{2n}$. Dado $x = (x_1, \dots, x_{2n}) \in \mathbb{R}^{2n}$, calcular su proyección ortogonal $p_S(x)$ al subespacio $S = \langle y, z \rangle$ (para el producto interno canónico), y deducir la siguiente desigualdad:

$$\left(\sum_{i=1}^{2n} x_i \right)^2 + \left(\sum_{i=1}^{2n} (-1)^i x_i \right)^2 \leq 2n \left(\sum_{i=1}^{2n} x_i^2 \right), \forall x \in \mathbb{R}^{2n}.$$

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS