

Teoremas para el final de Análisis II (c)

Este es un compilado de los 19 teoremas en general tomados en los finales de Análisis II (c), basado en las dos listas de teoremas que circulan por ahí. Intento que sea lo más comprensible y completo posible, pero no puedo hacerme responsable si algún teorema no presente acá es tomado en un final. No debiera pasar, pero quién sabe. Desde ya, espero que a quien esté leyendo esto le sirva de algo. La mayoría de las demostraciones aquí presentes fueron tomadas del [Cálculo de Larotonda](#) o de apuntes tomados en clase.

Todas las demostraciones transcritas fueron escritas con [Gallemathic](#). También me ayudó un montón a mí a la hora de estudiar estos teoremas.

Esta página también está disponible para descargar en PDF: [Teoremas del final de Análisis II \(c\).pdf](#).

El presente sitio se encuentra constantemente en desarrollo, es posible que algunos teoremas tengan detalles de estilo de los cuales otros carezcan. A su debido tiempo iré mejorando todo para que la lectura y comprensión de los temas sea más amena.

Índice

- ▶ [Teorema 1](#)
 - ▶ Sea $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $P \in A^0$, $L \in \mathbb{R}^m$. Entonces vale que: $(f \text{ es continua en } P) \Leftrightarrow (\forall \text{ sucesión } T_n (n \in \mathbb{N}) \text{ de puntos de } A / T_n \rightarrow P, f(T_n) \rightarrow f(P))$.
- ▶ [Teorema 2](#)
 - ▶ *Teorema de Bolzano*: sea $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Si existen puntos $P \in A$ y $Q \in A$ tales que $f(P)f(Q) < 0$, entonces existe un punto $c \in A / f(c) = 0$.
- ▶ [Teorema 3](#)
 - ▶ *Teorema de Bolzano en \mathbb{R}^n* : sea $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, con A arcoconexo y f continua en A . Si existen P y $Q \in A / f(P)f(Q) < 0$, entonces existe $R \in A / f(R) = 0$.
- ▶ [Teorema 4](#)
 - ▶ *Teorema de Weierstrass*: sea $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, con A compacto, f continua en A . Entonces existen m y $M \in \mathbb{R}$ tales que $m \leq f(x) \leq M \forall x \in A$. Además existen P_m y $P_M \in A$ tales que f alcanza su mínimo y máximo respectivos en A en dichos puntos.
- ▶ [Teorema 5](#)
 - ▶ *Diferenciable \Rightarrow Continua*: sea $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $P \in A^0$, y f diferenciable en P . Entonces f es continua en P .
- ▶ [Teorema 6](#)
 - ▶ *Sobre la existencia de las derivadas direccionales y la unicidad del diferencial*: sea $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Sea $p \in A^0$. Si existe una transformación lineal T_p tal que $\lim_{x \rightarrow p} \frac{\|f(x) - f(p) - T_p(x - p)\|}{\|x - p\|} = 0$, entonces existen todas las derivadas direccionales de f en p , y su fórmula es $T_p(v)$, con v un versor de \mathbb{R}^n ; $T_p(X) = Df_p(X) = \langle \nabla f(p), X \rangle$ para todo $X \in \mathbb{R}^n$ y f es diferenciable en P ; y la transformación lineal T_p es única.
- ▶ [Teorema 7](#)
 - ▶ *$\nabla f(p)$ es la dirección de máximo crecimiento de f en p* : sea f una función diferenciable en p . Entonces la dirección de máximo crecimiento de f en p viene dada por $\nabla f(p)$.
- ▶ [Teorema 8](#)
 - ▶ Teoremas de *Fermat, Rolle, Lagrange y Cauchy* en \mathbb{R} .
- ▶ [Teorema 9](#)
 - ▶ $C^1 \Rightarrow$ *Diferenciable*: En formato imagen.
- ▶ [Teorema 10](#)
 - ▶ *Teorema del Hessiano*: Sea $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, f una función de clase C^3 en A , con A abierto, $P \in A$ un punto de A tal que $\nabla f(P) = 0$. Entonces si el Hessiano de f en P ($Hf(P)$) es definido negativo, P es un máximo estricto de f . Si $Hf(P)$ es definido positivo, P es un mínimo estricto de f . Si $Hf(P)$ es indefinido, entonces P es un punto silla de f .
- ▶ [Teorema 11](#)
 - ▶ *Teorema de los multiplicadores de Lagrange*: En formato imagen.
- ▶ [Teorema 12](#)
 - ▶ *Continua \Rightarrow Integrable*: En formato imagen.
- ▶ [Teorema 13](#)
 - (Teorema fundamental del cálculo integral) Sea $f: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Dado $x \in [a,b]$ sea $F: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F(x) = \int [a,x] f = \int [a,x] f(t) dt$. Entonces F es continua en $[a,b]$, derivable en (a,b) y $\forall x \in [a,b]$ vale que $F'(x) = f(x)$.
- ▶ [Teorema 14](#)
 - ▶ *Regla de Barrow*: sea f una función continua en un cerrado $[a, b]$. Si F es una primitiva de f , se tiene que $\int [a, b] f = F(b) - F(a)$.
- ▶ [Teorema 15](#)
 - ▶ *Teorema del valor medio integral*: sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Entonces $\exists c \in (a, b) / \int [a, b] f = f(c)(b - a)$.
- ▶ [Teorema 16](#)
 - ▶ Dado P en una curva de nivel de $F(x, y)$ de clase C^1 tal que $\nabla F(P) \neq 0$, entonces $\nabla F(P)$ es perpendicular a la recta tangente a la curva en P . En formato imagen.
- ▶ [Teorema 17](#)
 - ▶ *Las derivadas cruzadas coinciden*.
- ▶ [Teorema 18](#)

Teorema de Lagrange en \mathbb{R}^n o Teorema del valor medio para funciones diferenciables: En formato imagen.

Teorema 19

Teorema de Fermat en \mathbb{R}^n : En formato imagen.

Teorema 1

Sean:

$f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

$P \in A^0$

Entonces vale que:

$(f \text{ es continua en } P) \Leftrightarrow (\forall \text{ sucesión } T_n (n \in \mathbb{N}) \text{ de puntos de } A \text{ tal que } T_n \rightarrow P, \text{ se cumple que } f(T_n) \rightarrow f(P))$

Demostración:

(1 \Rightarrow 2)

- Si f es continua en P , entonces vale que $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 / \|x - P\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(P)\| < \varepsilon$, es decir que puedo hacer la distancia de $f(x)$ a $f(P)$ tan chica como yo quiera acercando x a P .
- Sea T_n una sucesión de puntos de A , con $n \in \mathbb{N}$ tal que $T_n \rightarrow P$.
 - Esto implica que existe un n_0 a partir del cual T_n está suficientemente cerca de P .
 - Es decir, $\forall \varepsilon' > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} / n > n_0 \Rightarrow \|T_n - P\| < \varepsilon'$.
- Ahora, que f sea continua implica que puedo tomar cualquier ε y para ese ε existir un δ .
- Que $T_n \rightarrow P$ implica que siempre existe un n_0 a partir del cual T_n está a una distancia ε' o menor de P .
- Usando los dos últimos puntos, si tomo $\delta = \varepsilon'$ puedo decir lo siguiente: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta / \|T_n - P\| < \delta \Rightarrow \|f(T_n) - f(P)\| < \varepsilon$.

(2 \Rightarrow 1)

- Supongamos que f no es continua en P .
 - Entonces esto significa que $\forall \delta > 0 \exists \varepsilon > 0 \wedge \exists x \in A / \|x - P\| < \delta \wedge \|f(x) - f(P)\| > \varepsilon$.
- Ahora, como para toda sucesión $T_n \rightarrow P$ vale que $f(T_n) \rightarrow f(P)$, entonces esto significa que $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 / (\|T_n - P\| < \delta \Rightarrow \|f(T_n) - f(P)\| < \varepsilon)$.
- Como f no es continua, se puede tomar una sucesión de deltas $\delta_i = (1 / i)$ con $i \in \mathbb{N}$, tal que $(\forall \delta_i > 0, \exists \varepsilon' > 0 \wedge \exists x_i \in A) / (\|x_i - P\| < \delta_i \wedge \|f(x_i) - f(P)\| > \varepsilon')$.
- Como $i \rightarrow \infty \Rightarrow \delta_i \rightarrow 0$, y $\|x_i - P\| < \delta_i$, entonces se deduce que $x_i \rightarrow P$.
- Como x_i es una sucesión de puntos de A que tiende a P , entonces necesariamente $f(x_i) \rightarrow f(P)$.
 - Esto significa que $(\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0) / (\|x_i - P\| < \delta \Rightarrow \|f(x_i) - f(P)\| < \varepsilon)$.
- Ahora, si yo tomo $\varepsilon = \varepsilon'$ llegamos a un absurdo, pues habíamos dicho que $\|f(x_i) - f(P)\| > \varepsilon'$.
- Ha de ser entonces que f es continua en P .

Como $1 \Rightarrow 2 \wedge 2 \Rightarrow 1$, entonces $1 \Leftrightarrow 2$, que es lo que queríamos probar. \square

[Volver al índice](#)

Teorema 2

Teorema de Bolzano

Sean:

$f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua

Dos puntos $P \in A$ y $Q \in A$ tales que $f(P)f(Q) < 0$

Entonces:

Existe un punto $c \in A / f(c) = 0$

Demostración:

- Supongamos que $f(P) > 0$ y $f(Q) < 0$. El caso inverso es análogo.
- Sea S entonces el conjunto de los $x \in A / f(x) > 0$.

- ▶ $S \neq \emptyset$ porque al menos $P \in S$.
- ▶ Además, S está acotado superiormente al menos por Q , por lo que tiene un supremo s (notar la diferencia entre S y s).
- ▶ Como S es cerrado y acotado, o sea que $S \subseteq [P, s]$, puedo extraer una subsucesión creciente S_n de puntos de S que tienda al supremo.
- ▶ $S_n \rightarrow s$. Ahora hay dos posibilidades, $f(s) > 0$ o $f(s) = 0$.
 - ▶ Si $f(s) > 0$, entonces existe un entorno $(s - \epsilon, s + \epsilon) \cap [P, s]$ tal que $f(x) > 0 \forall x$ perteneciente a ese intervalo.
 - ▶ Como $s < Q$, ya que $f(Q) < 0$, entonces puedo tomar $x_0 \in (s, s + \epsilon)$ tal que $f(x_0) > 0$.
 - ▶ Pero entonces $x_0 \in S$ y $x_0 > s$, lo que es absurdo pues s es el supremo del conjunto.
- ▶ Debe ser entonces que $f(s) = 0$.
- ▶ Tomando $c = s$ se demuestra el teorema. \square

[Volver al índice](#)

Teorema 3

Teorema de Bolzano en \mathbb{R}^n

Sean:

- ▶ $A \subseteq \mathbb{R}^n$ arcoconexo
- ▶ $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$
- ▶ f continua en A

Entonces:

- ▶ Si existen $P, Q \in A / f(P)f(Q) < 0$, entonces existe $R \in A / f(R) = 0$

Demostración:

- ▶ Por ser A arcoconexo puedo definir una curva $\alpha(t): [0,1] \rightarrow A / \alpha(0) = P$ y $\alpha(1) = Q$.
 - ▶ Arcoconexo significa que dados dos puntos pertenecientes al conjunto, existe alguna curva de puntos del conjunto mediante la cual los puedo unir.
- ▶ Considero entonces una función $G(t) = f \circ \alpha(t)$
 - ▶ G es continua por composición de continuas.
 - ▶ G cumple que $G(0) = f(P)$ y $G(1) = f(Q)$.
- ▶ Como G es continua en $[0, 1]$ entonces $G(0)G(1) < 0$.
- ▶ Partiendo del punto anterior, existe $c \in (0, 1) / G(c) = 0$ por el [Teorema de Bolzano en \$\mathbb{R}\$](#) .
 - ▶ Es decir que $G(c) = f \circ \alpha(c) = f(\alpha(c)) = 0$.
- ▶ Si tomamos $R = \alpha(c)$ se demuestra el teorema \square

[Volver al índice](#)

Teorema 4

Teorema de Weierstrass

Sean:

- ▶ $A \subseteq \mathbb{R}^n$ compacto
- ▶ $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$
- ▶ f continua en A

Entonces:

- ▶ Existen m y $M \in \mathbb{R}$ tales que $m \leq f(x) \leq M \forall x \in A$.
- ▶ Existen P_m y $P_M \in A$ tales que f alcanza su mínimo y máximo respectivos en A en dichos puntos.

Demostración:

(Existencia de m y M)

- ▶ Veamos el caso de M , el de m es análogo. Supongamos que f no está acotada superiormente.

- Entonces no existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $M > f(x) \forall x \in A$.
- Por lo tanto debe existir una sucesión de puntos A_n de A tal que $f(A_n) \geq n \forall n \in \mathbb{N}$.
- Por ser A compacto, existe una subsucesión convergente de A_n que tiende a $P \in A$, sea esta subsucesión A_{n_k} .
- Por lo dicho anteriormente, se cumple que $f(A_{n_k}) \geq n_k \forall n_k \in \mathbb{N}$.
 - Como f es continua en A , f es continua en el punto P .
 - Se ve que es imposible que $f(A_{n_k} \rightarrow P) \geq n_k \forall n_k \in \mathbb{N}$, porque que f es continua P y no diverge ni pega saltos en P , por lo que eventualmente n_k será mayor a $f(P)$.
 - Por lo tanto, f debe estar acotada superiormente.
- Entonces existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $M > f(x) \forall x \in A$.

(Pm y PM)

- Ahora quiero ver que f alcanza su máximo y su mínimo en A . Veamos el caso de PM, en donde alcanza su máximo, el otro es análogo.
- Por el punto anterior, sé que $\text{Img}(f) \subseteq [m, M]$, por lo que tiene un supremo: s .
 - Quiero ver que s es en realidad un máximo.
- Tomo una sucesión creciente de puntos de $\text{Img}(f)$ que tienda al supremo.
- Como esta sucesión existe, puedo tomar una sucesión A_n de puntos de A tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} f(A_n) = s$.
 - De esta sucesión extraigo una subsucesión convergente A_{n_k} .
 - Al límite de A_{n_k} lo llamo P_m , de forma que $\lim_{k \rightarrow \infty} A_{n_k} = P_m$.
- Como A es un conjunto compacto, $P_m \in A$.
- Como f es continua en P_m , entonces $f(P_m) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(A_{n_k}) = s$.
- Por lo tanto f alcanza su máximo en A .

Dicho todo esto queda demostrado el teorema. \square

[Volver al índice](#)

Teorema 5

Diferenciable \Rightarrow Continua

Sean:

- $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$
- $P \in A^0$
- f diferenciable en P

Entonces:

- f es continua en P

Demostración:

- Partimos de la siguiente obviedad: $0 \leq \|f(x) - f(P)\|, \forall x \in A$.
- $\|f(x) - f(P)\| = \|f(x) - f(P) - Df(P)(x - P) + Df(P)(x - P)\|$
- $\|f(x) - f(P) - Df(P)(x - P)\| \leq \|f(x) - f(P) - Df(P)(x - P)\| + \|Df(P)(x - P)\|$
 - Porque $\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|$ (desigualdad triangular).
- $Df(P)(x - P) = \langle \nabla f(P), (x - P) \rangle$ que, por desigualdad de Cauchy-Schwartz, es menor a $\|\nabla f(P)\| \cdot \|x - P\|$.
- Juntando todo lo que teníamos hasta ahora, nos queda que:
 - $0 \leq \|f(x) - f(P)\| = \|f(x) - f(P) - Df(P)(x - P) + Df(P)(x - P)\|$
 - $\leq \|f(x) - f(P) - Df(P)(x - P)\| + \|Df(P)(x - P)\|$
 - $\leq \|f(x) - f(P) - Df(P)(x - P)\| + \|\nabla f(P)\| \cdot \|x - P\|$
 - Entonces $0 \leq \|f(x) - f(P)\| \leq \|f(x) - f(P) - Df(P)(x - P)\| + \|\nabla f(P)\| \cdot \|x - P\|$
- Ahora, multiplicamos y dividimos al primer término por $\|x - P\|$.
- Nos queda que: $\|f(x) - f(P) - Df(P)(x - P)\| + \|\nabla f(P)\| \cdot \|x - P\| = (\|f(x) - f(P) - Df(P)(x - P)\| / \|x - P\|) \cdot \|x - P\| + \|\nabla f(P)\| \cdot \|x - P\|$
- Si se fijan, $\|f(x) - f(P) - Df(P)(x - P)\| / \|x - P\|$ es la definición del diferencial de f en P , por lo que tiende a 0.
 - El diferencial de f en P ($Df(P)$) tiende a 0 cuando $x \rightarrow P \Leftrightarrow f$ es diferenciable.
- El segundo término, $\|\nabla f(P)\| \cdot \|x - P\|$, trivialmente tiende a 0 cuando $x \rightarrow P$.
- Por lo que ambos términos tienden a 0 y suman 0.
 - Por lo tanto, $\|f(x) - f(P) - Df(P)(x - P)\| + \|\nabla f(P)\| \cdot \|x - P\|$ tiende a 0 cuando $x \rightarrow P$.

- Juntando todo lo que conseguimos, $0 \leq \|f(x) - f(p)\| \leq 0$.
 - Por lo tanto $f(x) \rightarrow f(p)$ cuando $x \rightarrow p$.
 - Esto hace que f sea continua en p .
- Llegamos a que f es continua en p , que es lo que queríamos probar. \square

[Volver al índice](#)

Teorema 6

Sobre la existencia de las derivadas direccionales y la unicidad del diferencial

Sean:

- $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$
- Sea $p \in A^0$
- T_p transformación lineal tal que $\lim_{x \rightarrow p} (\|f(x) - f(p) - T_p(x - p)\| / \|x - p\|) = 0$

Entonces:

- La fórmula de las derivadas direccionales de f en p es $T_p(v)$, con v un versor de \mathbb{R}^n .
- Existen todas las derivadas direccionales de f en p .
- f es diferenciable en p .
- $T_p(X) = Df_p(X) = \langle \nabla f(p), X \rangle$ para todo $X \in \mathbb{R}^n$.
- La transformación lineal T_p es única.

Demostración:

- Si $\|f(x) - f(p) - T_p(x - p)\| / \|x - p\|$ tiende a 0 cuando $x \rightarrow p$, entonces lo hace por cualquier curva por la que x tienda a p .
- Sea entonces $x = p + tV$, con V un versor de \mathbb{R}^n .
 - Entonces $x \rightarrow p$ cuando $t \rightarrow 0$.
- Reemplazando en la ecuación de arriba me queda que $\lim_{t \rightarrow 0} (\|f(p + tV) - f(p) - T_p(tV)\| / |t|) = 0$.
- Como $\|V\| = 1$, entonces eso es igual a $\lim_{t \rightarrow 0} (\|f(p + tV) - f(p) - T_p(tV)\| / |t|) = 0$.
- Eso es igual a $\lim_{t \rightarrow 0} |(f(p + tV) - f(p)) / t - T_p(v)| = 0$.
- Puede verse entonces que $(f(p + tV) - f(p)) / t = T_p(v)$.
 - Recordemos, $\lim_{t \rightarrow 0} (f(p+tV)-f(p)) / t$ es la definición de la derivada en dirección V de $f(p)$.
 - Por lo anterior, se deduce que $T_p(V) = \partial f / \partial v(P)$.
 - Como V puede ser cualquier versor en cualquier dirección, entonces existen todas las derivadas direccionales.
 - Esto hace que f sea diferenciable en p .
- Como existen todas las derivadas direccionales para cualquier dirección V , en particular existen para cualquier dirección E_i , con E_i un versor de la base canónica.
 - Por ejemplo, en \mathbb{R}^3 los vectores de la base canónica son $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$.
 - Todos los vectores de una base canónica tienen norma 1.
- En particular, entonces, existen todas las derivadas parciales de f .
 - Las derivadas direccionales que van por la dirección de los vectores de la base canónica.
- Por otro lado, como una transformación lineal se determina por su valor en una base canónica de \mathbb{R}^n , y como $T_p(E_i) = \partial f / \partial E_i(p)$, entonces se deduce que $\langle \nabla f(p), x \rangle = T_p(x) \forall x \in \mathbb{R}^n$.
- Finalmente, falta ver que esta transformación lineal es única.
- Sea S_p otra transformación lineal que cumple lo enunciado en la hipótesis.
- Entonces se deduce que $\partial f / \partial v(p) = S_p(v)$ para cualquier versor v de \mathbb{R}^n .
- Esto mismo aplica para versores de la base canónica y, por lo tanto, se deduce que $S_p(v) = \langle \nabla f(p), v \rangle$.
- Pero $\langle \nabla f(p), v \rangle = T_p(v)$, por lo establecido en los puntos anteriores.
- Se deduce entonces que $T_p = S_p$, por lo que T_p es única. \square

[Volver al índice](#)

Teorema 7

$\nabla f(p)$ es la dirección de máximo crecimiento de f en p

Sea:

- **f una función diferenciable en p.**

Entonces:

- **La dirección de máximo crecimiento de f en p viene dada por $\nabla f(p)$.**

Demostración:

- Sea v un versor cualquiera.
 - Un versor es un vector de norma unitaria.
- Entonces $\langle \nabla f(p), v \rangle \leq |\langle \nabla f(p), v \rangle| \leq \|\nabla f(p)\| \cdot \|v\|$.
- Como $\|v\| = 1$, entonces $\langle \nabla f(p), v \rangle \leq \|\nabla f(p)\|$.
- Sea ahora $v = \nabla f(p) / \|\nabla f(p)\|$, que es el gradiente de f en p normalizado, un versor con la misma dirección que $\nabla f(p)$.
- Entonces $\langle \nabla f(p), v \rangle = \langle \nabla f(p), \nabla f(p) / \|\nabla f(p)\| \rangle = \|\nabla f(p)\|^2 / \|\nabla f(p)\| = \|\nabla f(p)\|$.
- Por lo tanto $\nabla f(p)$ es la dirección de mayor crecimiento de f en p. □

[Volver al índice](#)

Teorema 8

Elite Four de teoremas en una variable: Fermat, Rolle, Lagrange y Cauchy

Teorema de Fermat

Sea:

- **f derivable en (a, b)**
- **p ∈ (a, b) un extremo local de f**

Entonces:

- **$\nabla f(p) = 0$.**

Demostración:

- Supongamos que p es un máximo local. Si fuere un mínimo la demostración es análoga.
- Por ser máximo de f, existe un entorno $(p - \epsilon, p + \epsilon)$ de p tal que $f(x) \leq f(p)$ para cada x perteneciente a dicho entorno.
- Dicho esto, calculemos $f'(p)$ por límites laterales.
 - $\lim_{t \rightarrow 0^+} (f(p + t) - f(p)) / t \leq 0$
 - $\lim_{t \rightarrow 0^-} (f(p + t) - f(p)) / t \geq 0$
- Solo puede ser entonces que $\lim_{t \rightarrow 0} (f(p + t) - f(p)) / t = 0$, por lo que $f'(p) = 0$, que es lo que queríamos probar. □

Teorema de Rolle

Sea:

- **f continua en [a, b]**
- **f derivable en (a, b)**

Entonces:

- **Si $f(a) = f(b)$, existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.**

Demostración:

- Si f es una función constante (*línea recta horizontal*), entonces trivialmente su derivada es 0 para todo $x \in (a, b)$.
- Si f no es constante, entonces necesariamente al menos el máximo o el mínimo del *interior* se alcanzan en el *interior*, por [teorema de Weierstrass](#).
 - Esto sucede dado que f es continua en un compacto.
 - Digo en el interior porque capaz el máximo o el mínimo absolutos de la función son $f(a)$ y $f(b)$.
 - Por si hay dudas, el interior de $[a, b]$ es (a, b) .
- Sea c dicho mínimo, por [teorema de Fermat](#) $f'(c) = 0$, que es lo que queríamos probar □

Teorema de Lagrange

Sea:

- **f continua en [a, b]**
- **f derivable en (a,b)**

Entonces:

- **Existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = (f(b) - f(a)) / (b - a)$**

Demostración:

- Consideremos la siguiente función auxiliar: $g(x) = f(x) - L(x)$, donde L es la recta que une $f(b)$ con $f(a)$, de forma que $L(a) = f(a)$ y $L(b) = f(b)$.
- Por álgebra de continuas y derivables, g es continua en $[a, b]$ y derivable en (a,b) .
- $g(a) = f(a) - L(a) = f(a) - f(a) = 0$
- $g(b) = f(b) - L(b) = f(b) - f(b) = 0$
- Por los dos puntos anteriores, g cumple las hipótesis del [teorema de Rolle](#).
- Entonces Rolle nos dice que existe $c \in (a, b)$ tal que $g'(c) = 0$.
- Partiendo de la ecuación del primer punto, queremos ver que $g'(c) = f'(c) - m$.
 - La m sale de que las rectas como L tienen la pinta $p + mx$.
 - $(L(x))' = (p + mx)' = (p)' + (mx)' = 0 + m(x)' = 0 + m = m$
- Como $g'(c) = 0$, entonces nos queda que $f'(c) = m$.
- Pero m es la pendiente de la recta que une $f(a)$ con $f(b)$, por lo que $m = (f(b) - f(a)) / (b - a)$.
- Reemplazando nos queda que $f'(c) = (f(b) - f(a)) / (b - a)$, que es lo que queríamos probar. □

Teorema de Cauchy

Sea:

- **f continua en [a, b]**
- **f derivable en (a, b)**

Entonces:

- **Existe $c \in (a, b)$ tal que $(f(b) - f(a)) / f'(c) = (g(b) - g(a)) / g'(c)$.**
 - *Este es un resultado técnico más que nada.*

Demostración:

- Consideremos la siguiente función:
 $h(x) = (f(x) - f(a))(g(b) - g(a)) - (g(x) - g(a))(f(b) - f(a))$.
- Podemos observar que $h(a) = 0$ trivialmente.
- Podemos observar que $h(b) = (f(b) - f(a))(g(b) - g(a)) - (g(b) - g(a))(f(b) - f(a))$, ambos términos son el mismo, así que $h(b) = 0$.
- Por lo tanto, h cumple todas las hipótesis del [teorema de Rolle](#).
 - Nótese que las cualidades de continuidad y derivabilidad las adquiere por álgebra de derivables y continuas.
- De esta forma, Rolle nos asegura que existe $c \in (a, b)$ / $h'(c) = 0$.
- Observemos ahora que $h'(c) = f'(c)(g(b) - g(a)) - g'(c)(f(b) - f(a))$.
- Como $h'(c) = 0$, entonces tengo que $f'(c)(g(b) - g(a)) = g'(c)(f(b) - f(a))$.
- Distribuyendo llego a que $(f(b) - f(a)) / f'(c) = (g(b) - g(a)) / g'(c)$, que es a lo que queríamos llegar. □

[Volver al índice](#)

Teorema 9

$C^1 \Rightarrow$ Diferenciable

Sea $F: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $P \in A^\circ$.

Si las derivadas parciales de F en un entorno de P son continuas, entonces F es diferenciable en P .

Demostración

Quiero ver que $\lim_{x \rightarrow P} \frac{|F(x) - F(P) - \nabla F(P)(x-P)|}{\|x-P\|} = 0$

Escribamos $x = P + H$

$$F(P+H) - F(P) = \underbrace{F(P+H) - F(P+(H_1, 0))}_{(*)} + \underbrace{F(P+(H_1, 0)) - F(P)}_{(\oplus)}$$

$$(*) \quad F(P_1+H_1, P_2+H_2) - F(P_1+H_1, P_2) \stackrel{\text{TVM (Lagrange)}}{=} F_Y(P_1+H_1, \alpha) \cdot H_2$$

Con α entre P_2+H_2 y P_2

$$(\oplus) \quad F(P_1+H_1, P_2) - F(P_1, P_2) = F_X(P, P_2) \cdot H_1$$

Con α entre P_1+H_1 y P_1

Reemplazando queda:

$$\begin{aligned} & \frac{|F_X(P, P_2) \cdot H_1 + F_Y(P_1+H_1, \alpha) \cdot H_2 - [F_X(P_1, P_2) \cdot H_1 + F_Y(P_1, P_2) \cdot H_2]|}{\|(H_1, H_2)\|} \leq \\ & \leq \frac{|F_X(P, P_2) - F_X(P_1, P_2)| \cdot |H_1|}{\|(H_1, H_2)\|} + \frac{|F_Y(P_1+H_1, \alpha) - F_Y(P_1, P_2)| \cdot |H_2|}{\|(H_1, H_2)\|} \\ & \leq \underbrace{|F_X(P, P_2) - F_X(P_1, P_2)|}_{\downarrow 0} + \underbrace{|F_Y(P_1+H_1, \alpha) - F_Y(P_1, P_2)|}_{\downarrow 0} \end{aligned}$$

Tende a 0 pues las derivadas parciales son continuas en P .

Tienden a 0 cuando $(H_1, H_2) \rightarrow (0, 0)$

[\(Abrir en una pestaña nueva\)](#)

(Cortesía de Ezequiel Togno)

[Volver al índice](#)

Teorema 10

Teorema del Hessiano

Primero, un poco de introducción:

- Los puntos donde el gradiente de f se anula son candidatos a extremos relativos, pero no tienen por qué serlo. Estos puntos se llaman "puntos críticos". Si uno de estos puntos es efectivamente un extremo, llamemos P al punto, se dice que P es un extremo "estricto" si $f(P) > f(X) \forall X$ en un entorno de P . Nótese que la 'estrictitud' viene dada porque hablamos de $>$ y no de \geq .
- Dicho eso, decimos también que P es un punto silla de f si dadas dos trayectorias α y β que tiendan a P , $f(\alpha)$ tiene un máximo en P y $f(\beta)$ tiene un mínimo en P . En ambos casos, sin embargo, $\nabla f(P) = 0$.

Ahora sí, el teorema.

Sean:

- A un conjunto abierto**
- f: $A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$**
- f de clase C^3 en A**
- P \in A un punto de A tal que $\nabla f(P) = 0$**

Entonces:

- Si el Hessiano de f en P, $Hf(P)$, es definido negativo, P es un máximo estricto de f.**
- Si $Hf(P)$ es definido positivo, P es un mínimo estricto de f.**
- Si $Hf(P)$ es indefinido, entonces P es un punto silla de f.**

Unas cosas más antes de seguir:

- Que f sea de clase C^3 implica que sus derivadas primeras, segundas y terceras son continuas.
- El Hessiano es la matriz de las derivadas segundas de f .
 - Que sea definido positivo implica que los determinantes de sus menores principales son todos positivos.
 - Que sea definido negativo implica que los determinantes de sus menores principales son intercaladamente negativos y positivos, empezando por un negativo.

Demostración:

(Casos de Hessiano definido)

- Supongamos que $Hf(P)$ es definido positivo. El caso opuesto es análogo.
- Entonces para un X suficientemente cercano a P puedo describir a f en base a su polinomio de Taylor en \mathbb{R}^n . O sea, $f(X) = f(P) + (1/2)\langle Hf(P)(X - P), (X - P) \rangle + R(X - P)$.
 - Nótese que el término del gradiente *-derivadas primeras de $f(p)$ -* no aparece porque al ser un punto crítico es nulo.
- Dividiendo y multiplicando por $\|X - P\|^2$ nos queda que:
$$f(X) = f(P) + \|X - P\|^2 \left[(1/2)\langle Hf(P)((X - P) / \|X - P\|), ((X - P) / \|X - P\|) \rangle + R(X - P) / \|X - P\|^2 \right]$$
 - Nota: lo que está en naranja lo usaremos varias veces dentro del teorema, es por eso que está destacado, pero es parte de la misma fórmula.*
- Llamemos $Q_p(V)$ a $(1/2)\langle Hf(P)(V), V \rangle$.
 - Por propiedades del producto interno escalar, si ponemos el $(1/2)$ afuera o adentro es indistinto. Ahora lo ponemos adentro para poder hacer un truco.
 - Haciendo esto, nuestra expresión anterior queda así:
$$f(X) = f(P) + \|X - P\|^2 \left[\langle (1/2)Hf(P)((X - P) / \|X - P\|), ((X - P) / \|X - P\|) \rangle + R(X - P) / \|X - P\|^2 \right]$$
 - Ahora podemos reemplazar con $Q_p(V)$.
- Nos queda entonces que:
$$f(X) = f(P) + \|X - P\|^2 \left[Q_p((X - P) / \|X - P\|) + R(X - P) / \|X - P\|^2 \right]$$
 - Nótese que el vector $(X - P) / \|X - P\|$ tiene la misma dirección que $(X - P)$ pero es de norma unitaria ("está normalizado").
- Sea S un conjunto compacto *-cerrado y acotado-* tal que $S = \{V \in \mathbb{R}^n / \|V\| = 1\}$.
 - Nótese que S es una esfera n -dimensional de radio 1 centrada en el origen.
- Como Q_p es una función continua definida de $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, entonces por el [teorema de Weierstrass](#) alcanza su mínimo en S .
 - Atención que no es su mínimo absoluto de todos los valores posibles de la función, sino que toca su mínimo dentro de los valores que alcanza en S .
- Vamos a llamar a este mínimo "mp".
- Como lo alcanza, entonces existe un versor V_p tal que $Q_p(V_p) = mp$.
- Como $V_p \neq 0$ ya que $\|V_p\| = 1$, por pertenecer a S , entonces vale que $mp > 0$.
 - Esto es así porque $Hf(p)$ es definido positivo, y esto hace que $Q_p(V_p) > 0$ al multiplicar.
- Como este era el mínimo que alcanza Q_p en la esfera, vale que $Q_p \geq mp > 0$ para todo versor V .
- Por lo tanto, el $Q_p((X - P) / \|X - P\|)$ que teníamos en nuestro polinomio de Taylor va a ser siempre mayor a 0 (*recordemos que estamos considerando que $Hf(P)$ es definido positivo*).

- Cuando $X \rightarrow P$, $(R(X - P) / \|X - P\|^2) \rightarrow 0$ porque la diferencia entre $f(X)$ y $f(P)$ se achica cada vez más.
 - Esto sucede porque el polinomio de Taylor centrado en P es cada vez más exacto conforme $X \rightarrow P$.
- Juntando los dos puntos anteriores tenemos que $[(1/2)Hf(P)((X - P) / \|X - P\|), ((X - P) / \|X - P\|)] + R(X - P) / \|X - P\|^2$ es siempre positivo y mayor a 0
- Por lo dicho arriba nos queda que $f(X) = f(P) + \|X - P\|^2$ [término mayor a 0], por lo que $f(X)$ es siempre $f(P)$ más un poquito, lo que significa que $f(P) < f(X)$ para todo X en un entorno de P .
 - Nótese que $\|X - P\| > 0$ porque X tiende a P pero no es igual a P .
- El caso en el que $Hf(P)$ es definido negativo y $f(P)$ un máximo local es análogo.

(Caso de Hessiano indefinido)

- Si $Hf(P)$ fuera indefinido, existirían dos trayectorias W y Z tales que $Qp(W) > 0$ y $Qp(Z) < 0$.
- A través de estas trayectorias $f(X)$ es respectivamente mayor y menor a $f(P)$, por lo que se deduce que P ha de ser un punto silla de f .

Dicho todo esto, se demuestra el teorema. □

[Volver al índice](#)

Teorema 11

Teorema de los multiplicadores de Lagrange

• Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : g(x, y) = 0\}$ y $P \in S$. Si P es extremo de f restringido a S y $\nabla g(P) \neq 0$, probar que existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $\nabla f(P) = \lambda \nabla g(P)$.

Demo: Sea $P = (x, y)$. Por teorema de la función implícita (aplica porque $\nabla g(P) \neq 0$) existe una función h tal que en una vecindad de P se cumple $g(x, h(x)) = 0$. Podemos ver entonces que en dicha vecindad $\nabla g = 0$ lo que implica, por regla de la cadena,

$$\nabla g(x, h(x))(x, h(x)) = \nabla g(x, h(x)) \cdot (1, h'(x)) = 0.$$

Ahora lo que queremos es un extremo de $f(x, h(x))$ sin ninguna restricción (ya que el punto $(x, h(x))$ siempre pertenece a S). Para esto tomamos el gradiente igual a 0: $\nabla f(x, h(x))(x, h(x)) = \nabla f(x, h(x)) \cdot (1, h'(x)) = 0$. Dado que $\nabla g(x, h(x))$ y $\nabla f(x, h(x))$ son ambos perpendiculares al vector $(1, h'(x))$ (su producto interno da 0), deben ser paralelos entre sí, por lo cual existe λ tal que $\nabla f(x, h(x)) = \lambda \nabla g(x, h(x))$ y como $P \in S \Rightarrow y = h(x) \Rightarrow P = (x, h(x))$ queda demostrado el teorema. ■

[\(Abrir en una pestaña nueva\)](#)

[Volver al índice](#)

Teorema 12

Continua \Rightarrow Integrable

Veamos que si f es continua en $[a, b]$ entonces es derivable en $[a, b]$.

Sea $\varepsilon > 0$. Busca una partición R del intervalo tal que $S(f, R) - I(f, R) < \varepsilon$ con S la suma superior de f en R e I la inferior. Sea ahora

$\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{b-a}$. Como f es continua en un compacto, entonces es uniformemente continua en $[a, b]$. Esto significa que $\exists \delta > 0 / |f(x) - f(y)| < \varepsilon'$ cuando $|x - y| < \delta$.

Tomo entonces una partición R tal que el diámetro de R sea menor a δ .

Entonces, si $x_i, y_i \in \Delta_i \Rightarrow |x_i - y_i| < \delta$.

Ahora, $S(f, R) - I(f, R) = \sum (M_i - m_i) \Delta_i = \sum (f(x_i) - f(y_i)) \Delta_i$, donde $x_i, y_i \in \Delta_i$, $f(x_i) = \max(f|_{\Delta_i}) = M_i$, $f(y_i) = \min(f|_{\Delta_i}) = m_i$.

Se tiene entonces que $0 \leq f(x_i) - f(y_i) = |f(x_i) - f(y_i)| < \varepsilon'$, porque $|x_i - y_i| < \delta$. Por lo tanto, $S(f, R) - I(f, R) < \sum \varepsilon' \Delta_i = \frac{\varepsilon}{b-a} \sum \Delta_i = \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \varepsilon$.

Aplicando el criterio de integrabilidad se tiene que f es integrable, que es lo que queremos probar. \square

[\(Abrir en una pestaña nueva\)](#)

[Volver al índice](#)

Teorema 13

Teorema fundamental del cálculo integral

Nota: de acá en adelante, debido a las limitaciones de Gallemathic y html, voy a notar las integrales definidas de a hasta b de $f(t)dt$ como $\int [a, b] f(t)dt$.

Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Dado $x \in [a, b]$ sea $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F(x) = \int [a, x] f = \int [a, x] f(t)dt$. Entonces F es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y $\forall x \in [a, b]$ vale que $F'(x) = f(x)$.

Veamos esto. Sea s el máximo valor que toma $|f(t)|$ con $t \in [a, b]$, que como f es una función continua es un número finito. Vamos a probar que F es una función continua.

- Veamos primero que F es continua en los bordes. Como $F(a) = \int [a, a] f$, entonces $F(a) = 0$. Como $|F(x) - F(a)| = |\int [a, x] f| \leq \int [a, x] |f| = \inf S(|f|, P)$ que es el ínfimo de las sumas superiores de $|f|$, sobre cualquier P partición del intervalo $[a, x]$. Esto significa que $|F(x) - F(a)| \leq S(|f|, P)$, donde $S(|f|, P)$ es una suma superior de $|f|$ en una partición P , que es igual a $\sum [i] M_i \Delta_i$, donde M_i es el máximo de $|f|$ en el intervalo Δ_i (juntando todos los Δ_i formo P), que es menor o igual a $s \sum [i] \Delta_i$, donde s , como habíamos dicho, era el máximo de $|f|$ en $[a, b]$.

Tenemos entonces que $|F(x) - F(a)| \leq s \sum [i] \Delta_i$. Pero $s \sum [i] \Delta_i = s(x-a)$, entonces quedamos en que $|F(x) - F(a)| \leq s(x-a)$. Cuando $x \rightarrow a^+$, $s(x-a) \rightarrow 0$, con lo cual $F(x) \rightarrow F(a)$.

Podemos hacer la misma analogía con el intervalo $[x, b]$ hasta llegar a que $|F(b) - F(x)| \leq s(b-x)$. Como $s(b-x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow b^-$, entonces $F(x) \rightarrow F(b)$.

Con estas dos cosas probamos que F es continua en los bordes.

- Ahora vamos a probar que F es derivable, que $F' = f$ y que F es continua en el interior del intervalo. Para esto tomamos un punto $x_0 \in (a, b)$. Sea $x \in (a, b)$ otro punto cualquiera, calculemos lo siguiente: $(F(x) - F(x_0)) / (x - x_0)$.

$(F(x) - F(x_0)) / (x - x_0) = (\int [a, x] f - \int [a, x_0] f) / (x - x_0) = (\int [x_0, x] f) / (x - x_0)$. Si eso tiende a $f(x_0)$ cuando $x \rightarrow x_0$, esto probaría que F es derivable, que $F' = f$ y que F es continua en el interior.

Como f es continua entre x y x_0 , que eran puntos de $[a, b]$, entonces existen dos números reales, el máximo y el mínimo de f entre x y x_0 tales que $m \leq f(t) \leq M \forall t$ entre x y x_0 . No pongo $[x, x_0]$ o $[x_0, x]$ porque no sabemos cuál es el mayor.

Supongamos que $x > x_0$, total el razonamiento inverso es análogo. Se tiene lógicamente que $m(x - x_0) \leq \int [x_0, x] f \leq M(x - x_0)$. Ahora, como $x \neq x_0$, trivial, y $x > x_0$, se tiene que $x - x_0 > 0$, por lo que puedo dividir todos los términos por $(x - x_0)$ y me queda que $m \leq (\int [x_0, x] f) / (x - x_0) \leq M$.

Ahora, como m y M eran dos números entre x y x_0 , cuando $x \rightarrow x_0^+$, m y M tienden a $f(x_0)$, porque f es continua. Por lo tanto $(\int [x_0, x] f) / (x - x_0) \rightarrow f(x_0)$.

Como $(\int [x_0, x] f) / (x - x_0) = (F(x) - F(x_0)) / (x - x_0)$, entonces $(F(x) - F(x_0)) / (x - x_0) = f(x_0)$ cuando $x \rightarrow x_0^+$. Al probar el caso $x_0 > x$ se comprueba que $\lim_{x \rightarrow x_0} (F(x) - F(x_0)) / (x - x_0) = f(x_0)$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} (F(x) - F(x_0)) / (x - x_0) = f(x_0)$, se prueba que F es continua en el interior, derivable en todo el interior (y por tanto, efectivamente derivable) y $F' = f$, que es lo que queríamos probar \square

[Volver al índice](#)

Teorema 14

Regla de Barrow

Sea:

- $[a, b]$ cerrado
- f continua en $[a, b]$

Entonces:

- Si F es una primitiva de f , se tiene que $\int [a, b] f = F(b) - F(a)$.

Demostración:

- Si F es la primitiva que detalla el Teorema Fundamental del Cálculo, o sea, $F(x) = \int [a, x] f$, entonces es trivial que $\int [a, b] f = F(b) - F(a)$.
- Si no es esa primitiva, y la primitiva es G , entonces como ambas primitivas varían, cuando mucho, en una constante, se tiene que $G = F + c$.
- En consecuencia de lo anterior, $G(b) - G(a) = F(b) + c - F(a) - c = F(b) - F(a) = \int [a, b] f$.
- Juntando ambas cosas se tiene que para cualquier primitiva T de f , $\int [a, b] f = T(b) - T(a)$, que es lo que queríamos probar. \square

[Volver al índice](#)

Teorema 15

Teorema del valor medio integral

Sea:

- $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua.

Entonces:

- $\exists c \in (a, b) / \int [a, b] f = f(c)(b - a)$.

Demostración:

- Para demostrar este teorema solo hace falta aplicar el teorema de Lagrange en una variable a la primitiva F , tal que $F(x) = \int [a, x] f$, de f .


Es decir, $F(b) = \int [a,b]f = F(b) - F(a)$.

- Por [Lagrange en una variable](#) se tiene que si $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $[a, b]$ y diferenciable en (a, b) , entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $(F(b) - F(a)) / (b - a) = F'(c)$.
- Si movemos un poco esto nos queda que $F(b) - F(a) = F'(c)(b - a)$.
- Volviendo a lo anterior tenemos que $F(b) = \int [a,b]f = F(b) - F(a) = F'(c)(b - a)$.
- Sin embargo, como $F'(c) = f(c)$, entonces nos queda que $F(b) = f(c)(b - a)$.
- Eso último lo podemos reescribir como $\int [a,b]f = f(c)(b - a)$, que es lo que queríamos probar. \square


[Volver al índice](#)

Teorema 16

Dado P en una curva de nivel de $F(x, y)$ de clase C^1 tal que $\nabla F(P) \neq 0$, entonces $\nabla F(P)$ es perpendicular a la recta tangente a la curva en P .



[\(Abrir en una pestaña nueva\)](#)



[\(Abrir en una pestaña nueva\)](#)

(Cortesía de Ezequiel Togno)

[Volver al índice](#)

Teorema 17

Este es el de **las derivadas cruzadas coinciden**. Dado que no se toma nunca y su demostración es medio complicada, no voy a subirlo. Si se quiere ver por cuenta propia, está en la página 109 del Cálculo de Larotonda.

[Volver al índice](#)

Teorema 18

Teorema de Lagrange en \mathbb{R}^n

Proposición 3.3.1. (Lagrange) Sea $f : B_r(P) \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable. Entonces para todo $Q, R \in B_r(P)$ existe un punto P_0 en el segmento que une Q con R tal que

$$f(Q) - f(R) = \langle \nabla f_{P_0}, Q - R \rangle.$$

Demostración. Consideremos la parametrización del segmento que une Q con P , $g(t) = R + t(Q - R)$. Entonces $h(t) = f \circ g(t)$ está definida en $[0, 1]$, y es diferenciable en $(0, 1)$ por la regla de la cadena. Es más $h : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua pues f es continua por ser diferenciable. Entonces, por el Teorema de Lagrange en una variable, existe $c \in (0, 1)$ tal que $h(1) - h(0) = h'(c)$. Pero por la regla de la cadena, $h'(c) = Df_{g(c)}g'(c) = Df_{g(c)}(Q - R)$. Si llamamos $P_0 = g(c)$, se tiene la afirmación. \square

[\(Abrir en una pestaña nueva\)](#)

[Volver al índice](#)

Teorema 19

Teorema de Fermat en \mathbb{R}^n

Teorema 3.3.5. (Fermat en \mathbb{R}^n) Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, con A abierto. Supongamos que $P \in A$ es un extremo local de f . Entonces $Df_P = \nabla f_P = 0$. Equivalentemente, todas las derivadas parciales de f se anulan en P .

Demostración. Supongamos que P es un máximo local de f . Como $P \in A$ es un punto interior, podemos suponer que existe $r > 0$ y una bola abierta $B_r(P) \subset A$ tal que $f(P) \geq f(X)$ para todo $X \in B_r(P)$. Consideremos la función auxiliar $g(t) = f(P + tE_i)$, donde E_i es un vector de la base canónica. Entonces $g : (-r, r) \rightarrow \mathbb{R}$ es una función derivable, que tiene un máximo local en $t = 0$ pues $g(0) = f(P) \geq f(P + tE_i) = g(t)$. En consecuencia, debe ser $g'(0) = 0$. Pero esta derivada en cero es exactamente (usando la definición) la derivada parcial i -ésima de f en P . Esto prueba que $f_{x_i}(P) = 0$, y como i es cualquiera entre 1 y n , se tiene que el gradiente de f es cero en P . \square

[\(Abrir en una pestaña nueva\)](#)

[Volver al índice](#)